

# Nezapomínejme na křížáka *Larinioides ixobolus*

K. Rückl & V. Kroc  
Araneidae-cz

<http://araneidae-cz.sweb.cz/>  
[araneidae-cz@seznam.cz](mailto:araneidae-cz@seznam.cz)



Možná žije i u Vás



# *Nuctenea umbratica*???






# *Larinioides ixobolus* (Thorell, 1873)

- křižák rudohnědý
- palearktický druh
- ♀ 15-18 mm  
♂ 8-11 mm
- synantropní, často blízko vody

Reifezeit (NENTWIG W. et al. 2012)												
Monat:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
♀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
♂	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■





0-1900

1901-1950

1951-2000

2001-2017

Nálezy podle období

Druh

0-1900

1901-1950

1951-2000

2001-2017

*Larinioides ixobolus* (Thorell, 1873)

Není ohrožený

14x

34x

1x

## *Nuctenea umbratica*

téměř celé černé femory prvního a druhého páru nohou + kontrastní vůči distálnějším článkům

černý, kožovitý lesk folia abdomenu, folium často zřetelně světle lemované

výrazně kontrastní a kratší párová žlutá skvrna na ventrální straně abdomenu

## *Larinioides ixobolus*

proximální část femoru světlá s tečkami, distální část femoru tmavší

folium bez kožovitého lesku méně kontrastní přechod

párová skvrna na ventrální straně abdomenu ne tak výrazná a delší



*Nuctenea umbratica*

méně výrazné  
chloupkování

abdomen se distálním  
směrem více zužuje do  
špičky

abdomen více plochý

*Larinioides ixobolus*

výrazné chloupkování

abdomen se méně zužuje


abdomen více zaoblený a  
širší

# *L. ixobolus*





# Femora abdomen



# I. Marik: Aranearium





# *N. umbratica*





# *L. ixobolus*



# *L. ixobolus*



# Ventrální pohled

*Nuctenea umbratica*



*Larinioides ixobolus*





# Samci

*Nuctenea umbratica*



*Larinioides ixobolus*



## *Larinioides sclopetarius*

ohraničení folia: výrazný lem tvořený černou a bílou linií, přerušení cca v proximální 1/3, méně ostré vlnky

charakteristická kresba folia, značná barevná variabilita

výrazné "V" na začátku folia + bílý lem

## *Larinioides ixobolus*

ohraničení folia: bílá linie lemu nevýrazná či vůbec, lem nebývá přerušen, ostřejší vlnky

většinou jednotně vybarvené folium, menší barevná variabilita

"V" bez bílého lemu, někdy není vyjádřeno

*Larinioides sclopetarius*

výraznější proužek  
chloupků okolo hlavové  
části cefalotoraxu

kontrastnější kroužkování  
nohou

méně plochý a více  
kulovitý abdomen

*Larinioides ixobolus*

méně výrazný proužek  
chloupků okolo hlavové  
části cefalotoraxu

kroužkování nohou méně  
kontrastní

více plochý a méně kulovitý  
abdomen



# Barevná variabilita *L. sclopetarius*



# Porovnání - samice

*Larinioides sclopetarius*



*Larinioides ixobolus*



# Porovnání - samci

*Larinioides sclopetarius*



*Larinioides ixobolus*





# Závěr

*Larinioides ixobolus:*

1. Je hojným druhem, téměř tak hojným jako *Nuctenea umbratica* a *Larinioides sclopetarius*
2. Vyskytuje se ve stejných biotopech jako *Nuctenea umbratica* a *Larinioides sclopetarius*
3. Můžeme jej poměrně snadno odlišit od druhů *Nuctenea umbratica* a *Larinioides sclopetarius*

# Prameny

- Česká arachnologická společnost – dostupné z: <https://arachnology.cz/>
- Šestáková, Marusik & Omelko, 2014 : A revision of the Holarctic genus *Larinioides* Caporiacco, 1934 (Araneae: Araneidae). *Zootaxa*, no 3894(1), 61-82.
- Kůrka, Antonín. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015. Atlas (Academia). ISBN 978-80-200-2384-1.
- Marik I. Aranearium – dostupné z: <http://aranearium.cz/cz/>
- Wiki des Spinnen-Forums – dostupné z: <http://wiki.spinnen-forum.de/>

Děkujeme za pozornost!

Araneidae-cz  
araneidae-cz@seznam.cz





Nuctenea umbratica – Evropský pavouk roku 2017